

JURNAL AGROTEKNOLOGI

Journal of Agrotechnology

| | |
|--|-------|
| PEMBERIAN KOMPOS TKKS DAN COCOPEAT PADA TANAH SUBSOIL ULTISOL TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.) DI PRE NURSERY <i>Composting EFB And Cocopeat On Subsoil Ultisol To The Growth Of Palm Oil Seedlings In Pre Nursery</i> Siziko Andri, Nelvia, Sukemi Indra Saputra | 1-6 |
| PENGARUH INOKULASI CAMPURAN ISOLAT BAKTERI PELARUT FOSFAT INDIGENUS RIAU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (<i>Glycine max</i> L. Merr) <i>Effect of Riau Indigenus Phosphate Solubilizing Bacteria Isolate Mixture Inoculation on Soybean Growth and Yield</i> Lufita Nur Alfiah, Delita Zul, Nelvia | 7-14 |
| PROPAGASI IN VITRO ANGGREK (<i>Dendrobium phalaenopsis</i> Fitzg) TERHADAP PEMBERIAN HORMON IBA DAN KINETIN <i>In Vitro Propagation of Orchid (Dendrobium phalaenopsis Fitzg) on The Addition Iba and Kinetin Hormones</i> Imam Mahadi | 15-18 |
| PEMBERIAN BEBERAPA AMELIORAN TERHADAP PERUBAHAN SIFAT KIMIA TANAH GAMBUT <i>Giving Some Ameliorants To Changes Chemical Properties of Peat Soil</i> Ervina Aryanti, Yulita, Aulia Rani Annisava | 19-26 |
| ANALISIS SIFAT KIMIA TANAH GAMBUT PADA TIGA TIPE PENGGUNAAN LAHAN DI DESA PANGKALAN PANDUK KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN <i>An Analysis Of The Chemical Properties Of Peat On Three Types Of Land Use At Pangkalan Panduk Village Kerumutan Subdistrict Of Pelalawan Regency</i> Safrizal, Oksana, Robbana Saragih | 27-32 |
| KEANEKARAGAMAN SERANGGA PADA TUMPANGSARI TANAMAN PANGAN SEBAGAI TANAMAN SELA DI PERTANAMAN KELAPA SAWIT BELUM MENGHASILKAN <i>Insect Diversity on Intercropping System in Young Palm Oil</i> Lutfi Arifin, Mokhammad Irfan, Indah Permanasari, Auli Rani Annisava, dan A. Taufiq Arminudin | 33-40 |

Volume 7 Nomor 1, Agustus 2016

PRINT ISSN 2087-0620

ONLINE ISSN 2356-4091

JURNAL AGROTEKNOLOGI

Journal of Agrotechnology

Dewan Editor:

Ketua: Robbana Saragih

Anggota:

Didik Indradewa (UGM – Fisiologi Tumbuhan)

Novianti Sunarlim (UIN SUSKA RIAU - Agronomi)

Darda Efendi(IPB - Kultur Jaringan Tanaman)

Sobir(IPB - Molekuler Genetik)

Nugroho Susetya Putra(UGM – Ekologi Hama)

Sedyo Hartono (UGM – Fitopatologi)

Irwan Taslapratama(UIN SUSKA RIAU – Lingkungan Pertanian)

Fatimah Nursandi(UMM – Agronomi)

Aflizar(UNAND – Ilmu Tanah)

Rosmaina (UIN SUSKA RIAU - Pemuliaan Tanaman)

Willy Bayuardi (IPB - Pemuliaan Tanaman)

Editor Pelaksana:

Indah Permanasari

Irsyadi Siradjuddin

Bakhendri Solfan

Administrasi:

Ervina Aryanti

Lenny Sasmita

Penerbit:

Program Studi Agroteknologi

Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA RIAU

Alamat Editor:

Program Studi Agroteknologi

Fakultas Pertanian dan Peternakan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU)

Kampus Raja Ali Haji Jalan HR Soebrantas KM. 15 Pekanbaru

Telp. 0761. 7077837, Fax 0761 21129

Website : <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/agroteknologi>

E-mail: jurnal@agrotekuin.com

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

Tulisan dalam jurnal agroteknologi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan gaya bahasa efektif dan akademis. Bagi naskah berbahasa Inggris abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia sedangkan naskah berbahasa Indonesia abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Naskah yang dipublikasikan dapat berupa hasil penelitian penulis, review maupun sintesis yang berhubungan dengan Pertanian. Naskah **harus** belum pernah dan tidak akan dipublikasikan pada media lain.

Penulisan naskah dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris diketik dengan program pengolah kata MS.WORD, jenis huruf **Arial**, spasi tunggal, maksimal 10 halaman, kertas A4 (210 x 297 mm). Ukuran bingkai (*frame*) manuskrip: kiri 2,5 cm, kanan 2,5 cm, atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm. Naskah disusun atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. **Judul** artikel diketik dengan huruf kapital ukuran huruf 11, cetak tebal (*bold*), rata tengah (*align center*), spasi tunggal, singkat, jelas, padat dan tepat, menggambarkan hasil kajian yang hendak dikomunikasikan. Judul, harus singkat dan menunjukkan identitas subjek, indikasi tujuan studi dan memuat kata-kata kunci.
2. **Nama penulis** tanpa gelar akademik, ukuran huruf 10, spasi tunggal, diikuti dengan afiliasibawahnya, disertai alamat lengkap, untuk korespondensi termasuk telepon, fak dan email.
3. **Abstrak** merupakan abstrak informatif (bukan abstrak indikatif) merupakan uraian singkat tulisan asli yang menyajikan data pokok informasi penting serta kesimpulan dan keputusan-keputusan yang dimuat dalam tulisan asli. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris maksimum 250 kata dan ukuran huruf 10 dengan spasi tunggal.
4. **Kata Kunci (*keywords*)** maksimal 10 kata, ukuran huruf 10, disusun dari kiri ke kanan.
5. **Tubuh laporan** ditampilkan dengan format justifikasi (rata kanan-kiri), ukuran huruf 10 dan spasi tunggal..

Sitasi dalam teks menurut *author years system*.

- Artikel hasil penelitian memuat : pendahuluan, bahan dan metoda, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih (jika perlu) dan daftar pustaka.
- Artikel Tinjauan (review) memuat : Pendahuluan, Pokok-pokok pikiran yang dijadikan bahan analisis, Kesimpulan, ucapan terima kasih (jika perlu), daftar pustaka (bila ada).
- Secara utuh, tubuh laporan kajian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. **Pendahuluan** merupakan latar belakang, alasan penting dilakukan penelitian atau hipotesis yang mendasar, tujuan dan manfaat penelitian dan pendekatan umum serta telusuran literatur terkait.
 - b. **Bahan dan metode** berisi penjelasan mengenai bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan, waktu, tempat, teknik dan rancangan percobaan.
 - c. **Hasil dan pembahasan**, disajikan secara singkat (dapat dibantu dengan tabel, grafik, foto-foto), pembahasan merupakan tinjauan terhadap hasil penelitian secara singkat dan jelas serta merujuk pada literatur terkait. Tabel dan gambar harus jelas dan dapat dibaca.
 - d. **Kesimpulan dan saran**, merupakan hasil konkrit ataupun keputusan dari penelitian.
 - e. **Ucapan terima kasih, *acknowledgement***, kepada sponsor penelitian secara singkat.
 - f. **Daftar Pustaka**, mencantumkan semua pustaka berikut semua keterangan lazim dengan tujuan jika ada pembaca yang membutuhkan dapat dengan mudah menelusurinya.
- Tabel, grafik, dan atau gambar dapat terbaca jelas dan telah padu dalam teks, ukuran huruf 9.
- Sitasi dan penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis, ukuran huruf 10, menurut sistem Boston (Nama pengarang, tahun, judul, imprint), beberapa contoh sebagai berikut:

Buku

Darmawan, J. dan J.S. Baharsjah. 2010. *Dasar-dasar ilmu fisiologi tanaman*. SITC- Jakarta. 85p.

Artikel dalam buku dan risalah/prosiding

Chua, A.K., and A. Faridah. 1991. Liming of peat for some vegetable in Johore, Malaysia. pp. 393-398. *In* Aminuddin, B.Y. Tropical Peat. Proc. Int. Symp. on Tropical Peatland, Kuching, Sarawak, Malaysia, 6-10 May 1991

Artikel dalam jurnal/majalah

Sudarmadji. 2002. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Era Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Dasar*, 3 (1): 50-55

Artikel dalam website/internet

Hartono, S. 2005. Pengenalan dan Pengendalian Penyakit Keriting Kuning Cabai. <http://www.faperta.ugm.ac.id/perlintan2005/brt0003.htm>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2008

Manuskrip yang sedang dalam persiapan (*inferection*) atau telah dikirim (*submitted*) untuk publikasi, pengamatan yang tidak dipublikasi, komunikasi pribadi, dan lain sebagainya, tidak dimasukkan dalam daftar pustaka tetapi hanya diacu dalam teks (pengarang, tahun).

Penyerahan naskah artikel kepada pengelola jurnal dalam bentuk cetakan (*hard copy*) dan dalam bentuk *soft copy* berupa CD atau file melalui e-mail dan naskah harus diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jadwal penerbitan. Hanya naskah yang dalam bentuk hard copy yang disertai amplop dan berperangko cukup akan dikirim kembali kepada penulis apabila diminta.

Penulis bertanggung jawab memeriksa kembali *print out* siap cetak seperti kesalahan salah ketik, ejaan, istilah dan sebagainya sebelum diserahkan kepada editor. **Setiap tulisan yang dimuat akan dikenakan biaya Rp 250.000,- untuk setiap judul karya ilmiah Jurnal Agroteknologi.**

Kepada Yth:
Pengelola Jurnal Pertanian
Fakultas Pertanian dan Peternakan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Kampus Raja Ali Haji Jalan HR Soebrantas KM. 15
Simpang Baru Panam Pekanbaru
Telp. 0761. 7077837, Fax 0761 21129

FORMULIR BERLANGGANAN *

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal Pertanian

Nama/ Instansi :
Alamat :
.....
.....
.....
Jumlah Pesanan :
Volume ke :

..... ,

Tanda tangan dan nama terang

* Formulir dapat diperbanyak
Harga langganan + ongkos kirim
@ Rp 50.000,- (Pulau Sumatera)
@ Rp 55.000,- (Luar Pulau Sumatera)

PEMBERIAN KOMPOS TKKS DAN COCOPEAT PADA TANAH *SUBSOIL ULTISOL* TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (*Elaeis guineensis* Jacq.) DI PRE NURSERY

(Composting EFB And Cocopeat On Subsoil Ultisol To The Growth Of Palm Oil Seedlings in Pre Nursery)

SIZIKO ANDRI, NELVIA, SUKEMI INDRA SAPUTRA

Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Riau
Mobile: 0853 6463 0207, Email: siziko@yahoo.com

ABSTRACT

Palm oil (Elaeis guineensis Jacq.) is a plantation crop which is quite important in Indonesia because it accounts for foreign exchange and create employment that is high enough. Palm oil empty fruit bunches (EFB) is estimated at 20% of fresh fruit bunches (FFB) and coco in (cocopeat) are very much in Riau as raw material for fertilizer / compost. Subsoil ultisol a bottom layer of soil with sufficient depth within therefore very potential as a medium of palm oil nursery but has a low fertility signified by the nature of physics, chemistry and biology poor. Organic matter such as EFB compost and cocopeat can improve physical, chemical and biological subsoil ultisol. The research aimed to study the effect of EFB compost, cocopeat and a mixture of both the subsoil ultisol medium on the growth of palm oil seedlings in pre nursery. The study was conducted at the experimental station of Agriculture Faculty of the University of Riau from June to August, 2015. Research conducted an experiment using a completely randomized design (CRD) consisting of 6 treatments (K0 : without treatment, K1 : 100 g cocopeat, K2 : 100 g compost EFB, K3 : 50 g compost EFB + 50 g cocopeat, K4 : 75 g of compost EFB + 25 g cocopeat and K5 : 25 g compost cocopeat EFB + 75 g per plant) each repeated 4 times. The results showed treatment EFB compost 50 g and cocopeat 50 g produce in the growth palm oil seedlings better than the other treatments on medium subsoil ultisol in pre nursery.

Keywords: palm oil seedlings, Palm oil empty fruit bunches, Cocopeat and Subsoil Ultisols

PENDAHULUAN

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan tanaman perkebunan yang cukup penting di Indonesia karena menyumbang devisa dan menyerap tenaga kerja yang tinggi. Perkebunan kelapa sawit di Riau pada tahun 2013 mencapai 2.399.170 ha dengan tingkat umur yang berbeda. Oleh sebab itu dibutuhkan bibit cukup banyak untuk replanting. Pembibitan kelapa sawit membutuhkan tanah sebagai media yang cukup besar per bibit.

Tanah *top soil* merupakan tanah yang subur dan ketersediaannya makin berkurang karena terkikis akibat erosi atau penggunaannya yang terus menerus sebagai media pembibitan. *Subsoil ultisol* dapat menjadi alternatif untuk menggantikan peran *top soil* sebagai media pembibitan, karena letak lapisannya yang cukup dalam sehingga ketersediaannya banyak namun memiliki kesuburan yang rendah. Hidayat, *et al.*, (2007) menyatakan *subsoil ultisol* merupakan tanah yang miskin unsur hara dan memiliki tingkat kesuburan yang rendah ditandai dengan pH berkisar 4,5-5,6 kapasitas tukar kation rendah, N-total rendah, C-organik rendah dan Al-dd yang tinggi.

Pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dan *cocopeat* diharapkan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi dari *subsoil ultisol*. TKKS merupakan bahan organik yang potensial untuk kompos karena tersedia dalam jumlah banyak dan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Ningtyas dan Lia (2010) melaporkan bahwa kompos TKKS mengandung hara makro yaitu 2,15% N-Total; 1,54% P₂O₅; 0,15% K₂O; dengan pH (H₂O) 6,32 dan mengandung sedikit unsur mikro seperti Cu, Zn, Mn, Fe, Bo, dan Mo. Sedangkan Susanto *et al.*, (2005) melaporkan bahwa unsur hara yang terkandung pada tandan kosong kelapa sawit antara lain 42,8% C; 0,80% K₂O; 2,90% N; 0,22% P₂O₅; 0,30% Mg; 10ppm B; 23ppm Cu; dan 51 ppm Zn.

Selain TKKS, sabut kelapa dalam juga berpotensi sebagai pupuk organik. Serbuk sabut (*cocopeat*) merupakan bahan organik dari limbah kelapa dalam yang memiliki kandungan unsur hara yang cukup untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Agustin (2009) melaporkan *cocopeat* memiliki pH (5,2-6,8) dan mengandung 2,91% N; 0,08% P; 0,42% K; 0,4% Cl; 0,01% Na; dan nisbah C/N. Bahan organik *cocopeat* memiliki sifat

fisik seperti berat jenis;0,75 g/cm³, berat volume;0,13 g/cm³, dan porositas;91,9%. Oleh sebab itu pengaruh *cocopeat* terhadap sifat fisik *subsoil ultisol* lebih baik dibandingkan kompos TKKS.

Kusuma (2013) melaporkan bahwa pemberian kompos TKKS 20 ton/ha mampu meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter bonggol dibandingkan deskripsi standar pertumbuhan bibit kelapa sawit D X P Topas.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemberian kompos TKKS dan *cocopeat* guna mendapatkan dosis yang tepat pada medium *subsoil ultisol* terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di *pre nursery*.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Riau pada bulan Juni sampai Agustus 2015. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah kecambah kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) Varietas Topas 3, kompos TKKS, *cocopeat*, *sub soil ultisol*, air, insektisida dan fungisida. Alat yang digunakan adalah cangkul, *polybag* ukuran 25x25, meteran, jangka sorong, timbangan duduk dan analitik.

Penelitian dilakukan secara eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan (K₀: tanpa kompos TKKS dan *cocopeat*, K₁: 100 g *cocopeat*, K₂: 100 g kompos TKKS, K₃: 50 g kompos TKKS + 50 g *cocopeat*, K₄: 75 g kompos TKKS + 25 g *cocopeat* dan K₅: 25 g kompos TKKS + 75 g *cocopeat* per tanaman). Masing-masing perlakuan diulang 4 kali, Parameter yang diamati yaitu : tinggi bibit, diameter bonggol, jumlah pelepah daun dan luas daun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Bibit

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian campuran 50 g kompos TKKS + 50 g *cocopeat* per tanaman meningkatkan tinggi bibit kelapa sawit secara nyata dibandingkan dengan tanpa perlakuan *t*, 100 g *cocopeat* dan 25 g kompos TKKS + 75 g *cocopeat* dan lebih tinggi 8,2 cm dibandingkan standar PPKS yaitu 20 cm. Hal ini disebabkan pemberian kompos TKKS dan *cocopeat* pada dosis yang seimbang dapat memperbaiki sifat kimia sehingga meningkatkan ketersediaan hara makro dan mikro serta memperbaiki sifat fisik tanah seperti perbaikan struktur tanah, daya simpan air, pertukaran udara (aerasi tanah) dan kation hara serta meningkatkan peran

mikroorganisme tanah, karena kedua bahan organik tersebut mengandung hara lengkap dan memiliki sifat fisik yang baik.

Table 1. Tinggi Bibit Kelapa Sawit Varietas Topas Umur 3 bulan pada Media *Subsoil Ultisol* dengan Pemberian Campuran Kompos TKKS dan *Cocopeat*

| Kompos TKKS + <i>Cocopeat</i> g/tanaman | Tinggi Bibit (cm) |
|--|---------------------|
| 0 + 0 | 19,05 ^c |
| 0 + 100 | 21,88 ^c |
| 100 + 0 | 26,10 ^a |
| 50 + 50 | 28,20 ^a |
| 75 + 25 | 25,32 ^{ab} |
| 25 + 75 | 22,13 ^{bc} |

Ket : Angka-angka pada jalur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji DNMR pada taraf 5%.

Sutanto *et al.*, (2005) dan Ningtyas dan Lia (2010) melaporkan bahwa kompos TKKS mengandung hara yang lengkap seperti N, P, K, C, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Bo, dan Mo. Sedangkan Agustin (2009) melaporkan *cocopeat* memiliki pH (5,2-6,8) dan mengandung 2,91% N; 0,08% P; 0,42% K; 0,4% Cl; 0,01% Na; nisbah C/N;107,4 dan berat jenis 1,65 g/cm³, berat volume 0,13 g/cm³, porositas 91,9%. Menurut Gunawan dan Winata (2007) bahan organik *cocopeat* memiliki struktur gabus halus yang sulit terurai di dalam tanah namun memberikan keuntungan dalam menyerap dan mempertahankan air.

Menurut Nainggolan (2011), pertumbuhan tanaman yang normal diperoleh bila ketersediaan hara yang cukup dan seimbang di dalam tanah. Kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman merupakan faktor utama dalam pertumbuhan dan produksi tanaman (Soepadi, 2001). Ketersediaan hara yang cukup dalam tanah akan memberikan pengaruh terhadap pertambahan tinggi tanaman.

Valentino (2014) melaporkan pemberian 50 g kompos TKKS dan 50 g asam humat per tanaman pada *subsoil ultisol* di *main nursery* menghasilkan tinggi bibit kelapa sawit sebesar 22,30 cm sedangkan dengan tanpa perlakuan hanya 13,40 cm.

Tabel 1. menunjukkan bahwa tanpa kompos TKKS dan *cocopeat* menghasilkan tinggi bibit kelapa sawit yang paling rendah yaitu 19,05 cm. Hal ini disebabkan tidak tersedianya hara yang cukup dan lengkap serta sifat fisik *subsoil ultisol* yang kurang baik sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Hidayat, *et al.*, (2007) menyatakan *subsoil ultisol* merupakan tanah yang miskin unsur hara dan memiliki tingkat kesuburan yang rendah ditandakan dengan pH

berkisar 4,5-5,6 kapasitas tukar kation rendah, N-total rendah, C-organik rendah dan Al-dd yang tinggi.

Jumlah Pelepah Daun

Tabel 2. menunjukkan bahwa pemberian 100 g kompos TKKS, 50 g kompos TKKS + 50 g *cocopeat* dan 75 g kompos TKKS + 25 g *cocopeat* meningkatkan jumlah pelepah daun bibit kelapa sawit secara nyata dibandingkan dengan tanpa perlakuan atau pemberian 100 g *cocopeat*. Hal ini sejalan dengan perbaikan sifat kimia dan fisik tanah karena penambahan kompos TKKS dan *cocopeat*.

Perbaikan sifat kimia akan meningkatkan ketersediaan hara lengkap (makro dan mikro) serta perbaikan fisik tanah akan meningkatkan serapan hara dan air oleh akar tanaman. Peningkatan serapan hara dan air akan memacu proses fotosintesis dan metabolisme tanaman sehingga terbentuknya senyawa-senyawa yang berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Sebagai contoh protein, peningkatan jumlah protein akan meningkatkan jumlah sel yang berarti meningkatkan pertumbuhan tanaman, salah satunya jumlah pelepah daun.

Tabel 2. Jumlah Pelepah Daun Kelapa Sawit Varietas Topas Umur 3 Bulan pada Media *Subsoil Ultisol* dengan Pemberian Campuran Kompos TKKS dan *Cocopeat*

| Kompos TKKS + <i>Cocopeat</i> g/tanaman | Jumlah Pelepah Daun (helai) |
|---|-----------------------------|
| 0 + 0 | 3,37 ^c |
| 0 + 100 | 3,62 ^{bc} |
| 100 + 0 | 4,12 ^a |
| 50 + 50 | 4,25 ^a |
| 75 + 25 | 4,00 ^a |
| 25 + 75 | 3,87 ^{ab} |

Ket : Angka-angka pada jalur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji DNMRRT pada taraf 5%.

Pakpahan (2008) melaporkan pemberian 50 g kompos TKKS pada *topsoil inceptisol* di *main nursery* menghasilkan jumlah pelepah bibit kelapa sawit 6,66 helai jika dibandingkan dengan tanpa pemberian kompos TKKS hanya menghasilkan 4,16 helai.

Peningkatan jumlah pelepah daun bibit kelapa sawit tidak lepas kaitannya dengan pertambahan tinggi (Tabel 1.). Peningkatan tinggi bibit kelapa sawit juga akan berpengaruh terhadap jumlah pelepah daun. Hidajat (1994), menyatakan bahwa pembentukan daun berkaitan dengan tinggi tanaman, dimana tinggi tanaman dipengaruhi oleh tinggi batang. Semakin tinggi batang maka buku dan ruas semakin banyak sehingga jumlah daun meningkat.

Peningkatan jumlah pelepah daun juga disebabkan oleh genetik tanaman itu sendiri. Gardner *et al*; (1991) menyatakan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan daun dipengaruhi oleh faktor genetik dari tanaman itu sendiri sehingga dapat mempengaruhi jumlah daun, selain itu ketersediaan unsur hara juga dapat mempengaruhinya.

Luas Daun

Tabel 3. menunjukkan bahwa pemberian 75 g kompos TKKS + 25 g *cocopeat* menghasilkan luas daun bibit kelapa sawit tertinggi namun peningkatannya tidak nyata dengan pemberian 100 g kompos TKKS dan 50 g kompos TKKS + 50 g *cocopeat* tetapi berbeda nyata dengan tanpa perlakuan, 100 g *cocopeat* dan 25 g kompos TKKS + 75 g *cocopeat*. Pemberian kompos TKKS dan *cocopeat* dapat memperbaiki sifat kimia tanah sehingga meningkatkan ketersediaan hara dan meningkatkan serapan hara oleh akar tanaman.

Unsur C, H, O, N dan Mg berperan dalam pembentukan klorofil yang berguna dalam proses fotosintesis. Fotosintat hasil fotosintesis akan dimetabolisme menjadi berbagai senyawa organik yang berperan dalam pembentukan sel sehingga terjadi pertambahan luas daun.

Tabel 3. Luas Daun Bibit Kelapa Sawit Varietas Topas Umur 3 Bulan pada Media *Subsoil Ultisol* dengan Pemberian Campuran Kompos TKKS dan *Cocopeat*

| Kompos TKKS + <i>Cocopeat</i> g/tanaman | Luas Daun (cm ²) |
|---|------------------------------|
| 0 + 0 | 32,92 ^b |
| 0 + 100 | 38,00 ^b |
| 100 + 0 | 56,26 ^a |
| 50 + 50 | 56,13 ^a |
| 75 + 25 | 58,77 ^a |
| 25 + 75 | 40,27 ^b |

Angka-angka pada jalur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji DNMRRT pada taraf 5%.

Kompos TKKS mengandung unsur hara seperti unsur N, P dan Mg yang cukup untuk pertumbuhan tanaman dimana unsur N dan P membantu proses pembelahan dan pembesaran sel yang menyebabkan daun muda lebih cepat mencapai bentuk sempurna. Hal ini sesuai dengan pendapat Lakitan (2000) yang menyatakan bahwa ketersediaan unsur N dan P akan mempengaruhi daun dalam hal bentuk dan jumlah.

Unsur N dan Mg berperan dalam proses fotosintesis bila proses fotosintesis meningkat maka akan menghasilkan

karbohidrat dan senyawa-senyawa lainnya yang digunakan tanaman untuk pertumbuhannya, salah satunya pertumbuhan luas daun tanaman.

Diameter Bonggol

Tabel 4. menunjukkan pemberian 50 g kompos TKKS + 50 g *cocopeat* cenderung meningkatkan diameter bonggol bibit kelapa sawit dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan sudah mendekati standar pertumbuhan diameter bonggol PPKS (1,3 cm). Hal ini dikarenakan pertumbuhan diameter bonggol kelapa sawit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan diameter lainnya (tinggi bibit, jumlah pelepah daun dan luas daun).

Tabel 4. Diameter Bonggol Bibit Kelapa Sawit Varietas Topas Umur 3 Bulan pada Media *Subsoil Ultisol* dengan Pemberian Campuran Kompos TKKS dan *Cocopeat*

| Kompos TKKS + <i>Cocopeat</i> g/tanaman | Diameter Bonggol (cm) |
|--|-----------------------|
| 0 + 0 | 1,09 ^a |
| 0 + 100 | 1,22 ^a |
| 100 + 0 | 1,24 ^a |
| 50 + 50 | 1,25 ^a |
| 75 + 25 | 1,24 ^a |
| 25 + 75 | 1,16 ^a |

Ket : Angka-angka pada lajur yang diikuti huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DNMR pada taraf 5%

Pakpahan (2008) melaporkan pemberian 50 g kompos TKKS pada *topsoil inceptisol* di *main nursery* menghasilkan diameter bonggol bibit kelapa sawit sebesar 2,14 cm dan tidak nyata dibandingkan tanpa pemberian kompos TKKS yaitu 2,11 cm.

Pembesaran diameter bonggol dipengaruhi oleh ketersediaan unsur K dalam tanah. Unsur K berperan mempercepat pertumbuhan jaringan meristemik terutama pada batang tanaman, menguatkan batang sehingga tidak mudah rebah.

Menurut Leiwakabessy (1988) unsur K sangat berperan dalam meningkatkan diameter batang tanaman, khususnya dalam peranannya sebagai jaringan yang menghubungkan antara akar dan daun, kekurangan unsur K dapat menghambat proses pembesaran lingkaran batang. Unsur K yang terkandung dalam kompos TKKS yaitu 0,80% K dan dalam *cocopeat* mengandung 0,42% K.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian kompos TKKS dan *cocopeat* dengan dosis 50 g TKKS dan 50 g *cocopeat* menghasilkan pertumbuhan bibit

kelapa sawit yang baik di *pre nursery* pada medium *subsoil ultisol* dibandingkan dengan tanpa pemberian kompos TKKS dan *cocopeat*. Pemberian kompos TKKS dan *cocopeat* tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan diameter bonggol bibit kelapa sawit pada medium *subsoil ultisol*. Hal ini dikarenakan pertumbuhan diameter bonggol kelapa sawit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan parameter lainnya (tinggi bibit, jumlah pelepah daun dan luas daun).

Saran

Untuk mendapatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit yang baik di *pre nursery* pada medium *subsoil ultisol* adalah dengan pemberian kompos TKKS dan *cocopeat* dengan dosis dosis 50 g TKKS dan 50 g *cocopeat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Leizy Free.2010. Pemanfaatan Kompos Sabut Kelapa dan Zeolit sebagai Campuran Tanah untuk Media Pertumbuhan Bibit Kakao pada Beberapa Tingkat Ketersediaan Air. Skripsi Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jember, Indonesia.
- Gardner P. F., Pearee BR., Mitchell L. R.,1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. UI press. Jakarta.
- Gunawan dan Winata. 2007. Budidaya Anggrek. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Hidajat, E. B. 1994. Morfologi Tumbuhan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Kerja.
- Kusuma, Hadi. 2013. Pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit rotasi kedua dan ZPT alami di medium *Subsoil Ultisol* terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq). Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- Lakitan, B. 2005.Fisiologi Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Leiwakabessy, F. M. 1998. Kesuburan Tanah. Pertanian IPB. Bogor.
- Nainggolan, D. 2011. Pengaruh penyemprotan Zn, Fe, dan B pada daun tanaman jagung (*Zea mays* L) yang ditanam diareal pengendapan tailing. Skripsi sarjana pertanian fapertek unipa (tidak dipublikasikan)
- Ningtyas, V. A. dan Lia, Y. A. 2010.Pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sisa media jamur merah

- (*Volvarella volvaceae*) sebagai pupuk organik dengan penambahan aktivator Effective Microorganisme EM-4. Skripsi. Fakultas Teknik Kimia. Institut Teknologi Surabaya. Surabaya.
- Pakpahan Herwin. 2008. Aplikasi Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Di Pembibitan Utama. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). 2005. Pembibitan Kelapa Sawit. Medan.
- Soepardi, G. 2001. Sifat dan ciri-ciri Tanah. Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Sutanto A., A.E. Prasetyo, Fahroidayanti, A.F. Lubis, dan A.P. Dongoran. 2005. Viabilitas bioaktivator jamur trichoderma koningii pada media tandan kosong kelapa sawit. Jurnal Penelitian Tandan Kelapa Sawit. Volume 13(1) : 25-33.
- Valentino Sembiring Janrico. 2015. Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) Di Pembibitan Utama Pada Medium Sub Soil Ultisol Yang Diberi Asam Humat Dan Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Riau.

JURNAL AGROTEKNOLOGI

Journal of Agrotechnology

| | |
|--|-------|
| PEMBERIAN KOMPOS TKKS DAN COCOPEAT PADA TANAH SUBSOIL ULTISOL TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.) DI PRE NURSERY <i>Composting EFB And Cocopeat On Subsoil Ultisol To The Growth Of Palm Oil Seedlingsin Pre Nursery</i> Siziko Andri, Nelvia, Sukemi Indra Saputra | 1-6 |
| PENGARUH INOKULASI CAMPURAN ISOLAT BAKTERI PELARUT FOSFAT INDIGENUS RIAU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (<i>Glycine max</i> L. Merr) <i>Effect of Riau Indigenus Phosphate Solubilizing Bacteria Isolate Mixture Inoculation on Soybean Growth and Yield</i> Lufita Nur Alfiah, Delita Zul, Nelvia | 7-14 |
| PROPAGASI IN VITRO ANGGREK (<i>Dendrobium phalaenopsis</i> Fitzg) TERHADAP PEMBERIAN HORMON IBA DAN KINETIN <i>In Vitro Propagation of Orchid (Dendrobium phalaenopsis Fitzg) on The Addition Iba and Kinetion Hormones</i> Imam Mahadi | 15-18 |
| PEMBERIAN BEBERAPA AMELIORAN TERHADAP PERUBAHAN SIFAT KIMIA TANAH GAMBUT <i>Giving Some Ameliorants To Changes Chemical Properties of Peat Soil</i> Ervina Aryanti, Yulita, Aulia Rani Annisava | 19-26 |
| ANALISIS PEMASARAN PADI SAWAH DI KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU <i>Marketing Analysis Of Paddy Field In The Rambah Samo District Rokan Hulu Regency</i> Darus | 27-32 |
| KEANEKARAGAMAN SERANGGA PADA TUMPANGSARI TANAMAN PANGAN SEBAGAI TANAMAN SELA DI PERTANAMAN KELAPA SAWIT BELUM MENGHASILKAN <i>Insect Diversity on Intercropping System in Young Palm Oil</i> Lutfi Arifin, Mokhammad Irfan, Indah Permanasari, Auli Rani Annisava, dan A. Taufiq Arminudin | 33-40 |